

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL MARCA **ROCEL**

1. La vacuna se aplica diariamente.
2. El primer día de vacuna se aplica una gota, el segundo día 2 gotas, el tercer día 3 gotas, el cuarto día 4 gotas, el quinto día 5 gotas; a partir del sexto día se aplicarán 6 gotas en forma continua hasta terminar el frasco. CADA FRASCO NUEVO DE VACUNA SE APLICARÁ EN LA MISMA FORMA.
3. Aplicar las gotas de vacuna bajo la lengua, ó entre el labio y el diente canino (colmillo) y luego deglutir. Se deben dejar pasar por lo menos 10 minutos sin consumir líquidos, alimentos o sin enjuagar la boca.
4. No consumir alimentos ni líquidos, ni enjuagar la boca 10 minutos después de aplicar la vacuna.
5. La vacuna a las dosis señaladas y en el tiempo establecido dura aproximadamente 4 semanas.
6. La vacuna debe de conservarse en refrigeración a 4° C. Se debe evitar el congelamiento.
7. El tratamiento con vacuna hiposensibilizante es prolongado, requiere de dos años en promedio por lo que se recomienda NO SUSPENDER LA VACUNA por tiempos prolongados no aprobados por el médico.
8. En general no existen contraindicaciones para la aplicación de la vacuna en cuadros infecciosos leves ni simultáneamente con otros medicamentos o vacunas.
9. La vacuna tiene sustancias a los cuales el paciente es alérgico, la base científica es producir anticuerpos (defensas), contra estas sustancias y reducir los mecanismos que causan la alergia, de tal manera que el paciente ya no reaccione cuando se exponga a ellas.