

INSTRUCTIVO PARA VACUNA SUBLINGUAL IPI

1. La vacuna se aplica 5 días de la semana con dos días de descanso; por ejemplo de lunes a viernes con descanso sábado y domingo.
2. a) El lunes aplicar una gota, el martes 2 gotas, el miércoles 3 gotas, el jueves 4 gotas; EL VIERNES TAMBIEN SE APLICARÁN 4 GOTAS.

b) Sábado y domingo no dar vacuna.

c) A partir del lunes siguiente dar 4 gotas todos los días con descansos sábado y domingo. Ver la tabla al final.
3. Aplicar las gotas de vacuna bajo la lengua, ó entre el labio y el diente canino (colmillo) y luego deglutir. Se deben dejar pasar por lo menos 10 minutos sin consumir líquidos, alimentos o sin enjuagar la boca.
4. La vacuna a las dosis señaladas y en el tiempo establecido dura aproximadamente 4 semanas.
6. La vacuna debe de conservarse en refrigeración a 4° C. Se debe evitar el congelamiento.
7. El tratamiento con vacuna hiposensibilizante es prolongado, requiere de dos años en promedio por lo que se recomienda NO SUSPENDER LA VACUNA por tiempos prolongados no aprobados por el médico.
8. En general no existen contraindicaciones para la aplicación de la vacuna en cuadros infecciosos leves ni simultáneamente con otros medicamentos o vacunas.
9. La vacuna tiene sustancias a los cuales el paciente es alérgico, la base científica es producir anticuerpos (defensas), contra estas sustancias y reducir los mecanismos que causan la alergia, de tal manera que el paciente ya no reaccione cuando se exponga a ellas.

VACUNA SUBLINGUAL IPI. ESQUEMA DE DOSIFICACIÓN.

DIA		GOTAS	5 MILILITROS
1	LUNES	1	
2	MARTES	2	
3	MIERCOLES	3	
4	JUEVES	4	
5	VIERNES	4	
6	SABADO		
7	DOMINGO		
8	LUNES	4	
9	MARTES	4	
10	MIERCOLES	4	
11	JUEVES	4	
12	VIERNES	4	
13	SABADO		
14	DOMINGO		
15	LUNES	4	
16	MARTES	4	
17	MIERCOLES	4	
18	JUEVES	4	
19	VIERNES	4	
20	SABADO		
21	DOMINGO		
22	LUNES	4	
23	MARTES	4	
24	MIERCOLES	4	
25	JUEVES	4	
26	VIERNES	4	
27	SABADO		
28	DOMINGO		
29	LUNES	4	
30	MARTES	4	
		80 + - 4	Gotas

