


INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE VACUNA SUBCUTÁNEA (INYECTADA)

1. La vacuna debe de aplicarse dos veces por semana por vía subcutánea de preferencia días fijos, por ejemplo martes y viernes.
2. **EN LA FASE DE INDUCCION DE LA TOLERANCIA** se debe de iniciar con una décima de centímetro, o sea 0.10 ml (10 UI) aumentando una décima cada vez hasta llegar a 0.5 ml (50 UI). En promedio cada frasco a la dosis señalada dura aproximadamente cinco semanas.
- 3.- **EN LA FASE DE MANTENIMIENTO** se debe de iniciar con medio centímetro, o sea 0.50 ml (50 UI) y se deberá de mantener la misma dosis hasta el término de cada frasco. En promedio cada frasco a la dosis señalada dura aproximadamente cinco semanas.
4. Debe de inyectarse con jeringa de insulina la cual está graduada hasta 100 UI correspondiendo 10 UI a 0.1ml y 100 UI a 1ml, o con jeringas de insulina graduadas hasta 50 UI.
5. La vacuna debe de conservarse en refrigeración a 4° C.
6. Si la vacuna produce reacción local (edema, enrojecimiento) en el sitio de la aplicación no debe de aumentarse a la siguiente dosis sino aplicar la dosis anterior que no provocó reacción por una o varias ocasiones mas.
7. El tratamiento con vacuna hiposensibilizante es prolongado, requiere de dos años en promedio por lo que se recomienda **NO SUSPENDER LA VACUNA** por tiempos prolongados no aprobados por el médico.
8. En general no existen contraindicaciones para la aplicación de la vacuna en cuadros infecciosos leves ni simultáneamente con otros medicamentos o vacunas.
9. La vacuna tiene alergenicos a los cuales el paciente es alérgico, la base científica es producir anticuerpos (defensas), contra estas sustancias y reducir los mecanismos que causan la alergia de tal manera que el paciente ya no reaccione cuando se exponga a ellas.



FASE DE INDUCCIÓN DE LA TOLERANCIA.

CONTENIDO DEL FRASCO 3.5 ML

6 FRASCOS COMO DOSIS TOTAL DE INDUCCION DE LA TOLERANCIA. 6 meses.

	INDUCCION DE LA TOLERANCIA			
	MARTES	VIERNES		
SEMANA 1	0.1 ml 10 UI	0.2 20 UI	LA VACUNA TIENE UNA DURACION DE 8 APLICACIONES CON UN REMANENTE EN LA SEMANA 5, ESTE REMANENTE DEBERA SER APLICADO.	
SEMANA 2	0.3 30 UI	0.4 40 UI		
SEMANA 3	0.5 50 UI	0.5 50 UI		
SEMANA 4	0.5 50 UI	0.5 50 UI		
SEMANA 5	0.5 50 UI			
Total	3.5 ml			

MANTENIMIENTO

CONTENIDO DEL FRASCO 4.5 ml

A partir del frasco 7

Todas las dosis deberán ser aplicadas en 0.5 ml (50 UI). Dos veces por semana.

	MANTENIMIENTO			
	MARTES	VIERNES		
SEMANA 1	0.5 ml 50 UI	0.5 ml 50 UI	LA VACUNA TIENE UNA DURACION DE 8 APLICACIONES CON UN REMANENTE EN LA SEMANA 5, ESTE REMANENTE DEBERÁ SER APLICADO.	
SEMANA 2	0.5 50 UI	0.5 50 UI		
SEMANA 3	0.5 50 UI	0.5 50 UI		
SEMANA 4	0.5 50 UI	0.5 50 UI		
SEMANA 5	0.5 50 UI			
TOTAL	4.5 ml			