

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA INMUNOTERAPIA SUBLINGUAL MARCA ALK- Abelló

1. La vacuna se aplica diariamente.
 2. El primer día de vacuna se aplica una gota, el segundo día 2 gotas, el tercer día 3 gotas, el cuarto día 4 gotas, el quinto día 5 gotas; a partir del sexto día se aplicarán 6 gotas en forma continua hasta terminar el frasco.
- CADA FRASCO NUEVO DE VACUNA SE APLICARÁ EN LA MISMA FORMA.
3. Aplicar las gotas de vacuna bajo la lengua.
 4. Se puede aplicar a cualquier hora del día, antes o después de los alimentos
 5. La vacuna a las dosis señaladas y en el tiempo establecido dura aproximadamente 4 semanas.
 6. La vacuna debe de conservarse en refrigeración a 4° C. Se debe evitar el congelamiento.
 7. El tratamiento con vacuna hiposensibilizante es prolongado, requiere de dos a tres años en promedio por lo que se recomienda NO SUSPENDER LA VACUNA por tiempos prolongados no aprobados por el médico.
 8. En general no existen contraindicaciones para la aplicación de la vacuna en cuadros infecciosos leves ni simultáneamente con otros medicamentos o vacunas.
 9. La vacuna tiene sustancias a los cuales el paciente es alérgico, la base científica es producir anticuerpos (defensas), contra estas sustancias y reducir los mecanismos que causan la alergia, de tal manera que el paciente ya no reaccione cuando se exponga a ellas.

La inmunoterapia específica se prepara de acuerdo a las necesidades de cada paciente, y se hace bajo las especificaciones del laboratorio ALK-Abelló, España

Dr Julio César Gómez Martínez

Cédula de especialidad 3414302.

Consejo Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia 347